день. Капли в нос- проторгол 1% по 2капли 4раза в день. Общий расслабляющий массаж № 4. Эл.форез со спазмолитиками С1-С5 поперечно №4.

В динамике – в неврологическом статусе: уменьшается гипертонус конечностей, лучше разведение бедер в тазобедренных суставах. Кратковременно сидит без поддержки. Опора на менее грубые цыпочки, переступает живее.

У ребенка отмечались серозные выделения из носовых ходов, общее самочувствие не нарушалось. По поводу острого ринита получал лечение.

Рекомендовано.

1. Наблюдение невролога по месту жительства.
2. 2-3раза в год продолжать восстановительную терапии.
3. Пантогам 10% - по 2мл 2раза в день, 2месяца, циннаризин — 0.025 по 1\3таб 3раза в день, 14дней, затем, после окончания приема циннаризина, мидокалм — 50мг по 1\ 4таб 3раза в день между кормлениями — 1месяц. Один из премов препарата перед массажем.
4. Общий расслабляющий массаж, ЛФК курсами 3раза в год. Парафин — озакеритовые аппликации на нижние конечности №10 — 3 раза в год. Иглорефлексотерапия.

Зав. отд. _____ Ковач А.М.

«Городская больница № 9»

Леч. врач _____ Эксузян Э.Ф.